




YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY



This is doubtless the source  
 of Varoli's contributions to the  
 1541 Giunta Galen ① De ner-  
vorum dissectione and ② De  
venarum arteriarumque dis-  
sectione as interpreted by  
 Antonio Forstoso



There is hardly a line of  
writing on this page  
and it is very faint  
and illegible  
The handwriting is very  
faint and illegible  
The handwriting is very  
faint and illegible  
The handwriting is very  
faint and illegible



**C** Galeni Per  
gameni Dissectiōis  
venarū arteriarūq;  
commentarium.

**E**iusdem de Mero  
ris compendium.

Antonio fortolo Jo  
seriēsi interprete.

1528

# EPISTOLA.

✶ORNATISSIMO VIRO D.

Roberto Thyrselino, in supremo Parisien  
si Senatu Consiliario prudentissimo  
simul & humanissimo Antonius

Fortolus S.D.



QVm multa sunt clarissime Thyr  
seline, ob quæ merito & tati nra  
gratulari cõueniat: in qua artes  
pene omnes ab interitu propemo  
duz reuocatas, excoli felicius, ex  
erceriq; contigerit: tum nulla profeðo res maior  
ri laude huius seculi homines cumulauit, quas  
Medicina. Cum enim ea uniuerso hominũ gene  
ri salutaris, uel potius necessaria sit: minimũq;  
referat, utrum rem primus aliquam inuenias,  
an inuentam quidem iandiu, sed obsoletam, ac  
fere extinctã primus lōgo intervallo restituas,  
atq; excites: tanto sane, quã ex ceteris artibus,  
maior ex restituta medicina laus sit oportet, quã  
to illa & utilior est, q̃ ceteræ artes, ad tuendã  
humanã uitam, & maior eius restituendæ diffio  
cultas, desperatioq; fuit. Nec uero in contentio  
nẽ hic uenit, cui orbis parti plurimũ ex pulcher  
rima hac re, laudis debeat. Eam certe laudes  
ut cisalpinae gentes cum Italia communẽ habe  
remus, Ruellij, Copi, Linacriq; uirorũ doctis  
simorum opera factum est. Hoc autem affirma  
re uerissime posse mihi uideor, in nulla usquam

academia, ita ueram uigere medicinā, atque in  
Parisiensi: a qua longē nūc exulant sophistice,  
ac barbaries. quæ duæ pestes, sicut in alias ordo  
nes egregias disciplinas irruperant, ita in medi  
cinā perditæ se uierant, apud superioris ætatis  
homines. His ego animatus cum statuerim, quic  
quid hac parte possim, ad publicā conferre uti  
litatem: initiū audendi ab interpretatione mihi  
faciendum duxi. Delegi autem ex Galeni libris  
permultis hæc duo potissimum ad anatomicen  
pertinentia opuscula, quibus e Græco in Latio  
nūc uertendis periculum facerem, quid præsta  
re hoc in genere possem. Quantum itaque cono  
secutus sim, aliorum erit iudicium. Si quod uoa  
lebam, minime effeci, generosis conatibus ues  
niam dabūt, qui æ quiore animo ad hæc iudicā  
da, æstimandaque accesserint. Id quidem certe  
assecutū me esse cōfido, ut si delis perspicuusq;  
interpret essem. Elegantiā libenter iis reliqui,  
quos eius rei præcipue studium teneret. Quam  
quam ne id quidem, quantum ex prima illa in  
stitutione puerili præstare potui, a me neglectū  
esse calumniari quis possit. Hos igitur primos la  
borum, ac studiorū meorum fructus tibi Thyrs  
eline dedicaui, quem scirem et ipsū esse doctis  
simum, et studiosorum hominum egregium  
patronum. Nec quicquam ueritus sum, ne in eo  
ptus me quis iudicaret, quod Senatori præstan



## EPISTOLA

tissimo, & grauissimis in rebus maxime occupa-  
to, commētariū de uenis, arterijs, & neruis as-  
ferrem: rem scilicet nec professioni tuæ conue-  
nientem, nec satis dignā amplitudine tua. Cui  
enim dare obsecro potius debui, quam ei, qui &  
in omni genere doctrinæ excelleret: & ea prædi-  
tus esset humanitate, ut nihil, quod modo ad lite-  
ras pertineret, non sua dignum authoritate iudi-  
caturus esset? Abs te itaq; clarissime Thyrseline  
peto, ut si parum hac in re habitam tui rationē  
arbitraberis, non tam temeritate, impudentia  
que factum putes, quam summa erga nobilita-  
tem tuā obseruantia: quæ me sane commouit, ut  
omne quod mihi industria mea pareret, tibi of-  
ferrem. Vale.

GALENI PERGAMENTI  
dissectionis Venarū Arteriarūq; cōmentariuz  
Antonio Fortolo Ioseriensi interprete.



OMMENTA  
rium de uenaruz &  
arteriarū dissectione  
charissime Antisthe  
nes, quo a me donao  
ri uoluisti ad memo  
riam confirmādam  
eorū, quæ ipse in sis  
miæ corpore spectas

ses, hoc opere confeci. Exacta autem, & cuo  
mulata non horum modo sed omnium reliqua  
rum partim narratio libris continetur, quos de  
administranda corporum dissectione inscripsis  
mus. Nunc itaq; quo facilius euadat commenta  
tio, cogitatione uolo completaris arboris quens  
dam truncum parte quidem inferiore in mulo  
tis findi radices, superiore in numerosam sobo  
lem diffundi. Hanc enim docendi gratia similio  
tudinem, non unus tantum secutus est Hippo  
crates, sed quicunq; tempore posteriores Ana  
tomici fama celebres extiterunt. Igitur quæ in  
uentrem, intestinaq; deferuntur uenæ, propor  
tione radicibus respondent. Ea uero, quam tus  
iecorariam, tum cauiam appellant, quidaz uelu  
ti truncus est omnium quæ toto corpore spargū

## GALENI LIB.

tur, uenarum. Eadem ratione arteriæ quarum origo omnium est a corde, quæ ex illis sparsa ramorum serie pulmones petunt, radicum imaginationem ostendunt. Quæ autem Aristoteles aortam, alij arteriam magnam uocant, ea etiam caudicis in arbore proportionem subit. Principio igitur septem uenarum te commonere uolo, quæ ad uentres pertinentes, uno ex principio prodeunt, ea nimirum iecoris parte, quæ portas uocat. Hinc enim orta magna uena, fertur obliqua deorsum, alias obiter animantis partes perreptans fere circa mediū eius intestini, quod Herophilus τὴν ἀσθενήσαντι γαστρὶ ἐν φυοῖν appellat. quæ si tu dicas productionem intestini longitudine duodenū digitorū. Ita enim illi appellatur principium intestini, prius quam in anfractus, orbisq; conuoluatur. Sane eo primū breuem quādam uenam mittit, quæ in nonnullis sola appareret, plurimū autem alijs comitata capillorum modo prætenuibus, quæ tū ad ἐνφυοῖν tendunt, tum ad id quod a carne pancreon, uel calicreon uocat. Id autem caro glandulosa est substrata arterijs, uenisq;, quæ ea parte in ramos finduntur. Tum alia etiā ad pyloron assurgens parua uena, toti quæ est circa ipsum, et ante est, uentriculi parti distribuitur. Rami autem insigni amplitudine, ab ea que ad portas existit, procurant: primus quidem ad concavū uentris: alter



DE DISSECT. VENA. Fo. iij.

ad lienem, qui in aliquibus simiis promitur qui  
dem initio tantum unicus, sed statim ab exortu  
bisaria scinditur et parte quidez una uentrem,  
altera lienem adit. Atq; quum duæ sunt uenæ,  
ipsæ ettā exorientes mutuo se contingunt. Quæ  
igitur ad concavum uentriculi tendit, propius  
pyloron nascitur. Is autem pars ima uentricu-  
li est, quæ ad dextram prope iecur situm habet.  
Nā in his animantibus oblique satis positus uē-  
ter est. Sed enim ad ipsum uentriculi concavū,  
non æqualiter ramos mittit uena hæc. Quando  
quidem id omne uentriculi, quod ad sinistram  
est, usq; ad gulæ exortū, aliæ amplectuntur ue-  
næ ex alia ductæ, quæ ad lienē porrigitur. Hæc  
enim parua satis existens, dum ad lienem tens-  
dit, multas obiter pilorū modo graciles uenas,  
in pancreon edit. quumque iaz prope lienē per-  
uenerit, notabili magnitudine ramum ad con-  
cavum uentris mittit. Quæ porro ipsius pars  
lienem adit, circa eius maxime medium sedem  
habet. Deinde inibi in ramos scissa, toto uiscere  
qua est concavum, elatior expanditur, multis  
in ipsum ueluti radicibus infitis. Nec uero hic  
totā ramos exhauritur, sed mediocri magnitu-  
dine ipsius extrema sunt utraq;. Eorū itaq; al-  
terum a capite ad gibba uentriculi subit: alterū  
ex imo ad omenti partem sinistriorem. Et hæc  
quidez fere ita habent. Nonnunq; uero, quanq;

GALENI LIB.

Irarius, prius quam ad splenis caput pertineat, magna uena ad uentris gibba attollitur: ramus ex se, tum ad reliquum splenem, tum uero ad concaua uentris, usque ad ipsius os, emittens. Tertia ab eis quas memorauimus, ex magna uena nascitur, eodem quo illa modo ad partem sinistrae extremum magnorum intestinorum mesenterium ad sedem usque complexa. Eodemque modo non ita multo post quam haec orta est, alia quaedam a dextris partibus ex eadem magna uena propter pyloron nata, ad gibba uentriculi effertur. A qua subeunte, propagines ad omenti ipsius dexteriolem partem existunt, positum, quam maxime fieri potest ei contrarium habentes, quam modo ad omentum ipsum de lienis infima parte ferri diximus. Quinetiam post haec, alia quoque ex uena magna oritur ipsius latere dextro, quae coli, id est crassioris intestini mesenterium inibi positum, numerosiore uenularum propagine adit. Iam totum, quod reliquum est ex uena, quam a porta oriri diximus, ad spatium peruenit, quod inter duo iam dicta mesenteria iacet. Id autem plurimas sane uenas habet: et in ieiunum primus, deinde in omne deinceps tenue intestinum fissura multiplici diuiditur. Postrema uero eius pars, tum caecum intestinum completitur, tum quamdam coli partem, qua ipsum caeco adnectitur. Ad hunc sane modum uena illius, quae a portis

## DE DISSECT. VENA. Fo. v.

prodit, in intestina, splenem, et uenterculus digestio perficitur. Quinetiam omnes omento in texta uena, ab eis de ipsi uenis propagantur. Illa quidem, quae tum in dextris, tum in sinistris sunt partibus, sicut paulo ante ostendimus. Quae autem anteriorem, mediamque eius regionem obtinent, ex illis oriuntur, quae gibba uentriculi partem perreptant. Postremo quae in membrana omento subdita sunt uenulae, quae exiguae omnino sunt, ab ijs ortum habent, quas sub concava parte uentriculi porrigi diximus. Tam illud meminisse te uolo, uenarum uentriculi gibbum completentium, quae, ut modo dixi, duae sunt, extrema sese mutuo contingere, et illarum utranque quibusdam subnixam ceu fulcris, elatorem per uentriculi gibbum circumire. Dissimili plane ab ijs modo se habet concava partis uena. ea siquidem contra uenterculum exorta, corpori ipsius adnectuntur, atque insident. At uero lienis uena similiter ut gibba uentriculi partis uena, membranis fulta, concavum omne peruadit. Sunt autem et aliae uenae in tenuiorum intestinum medio mesenterio, quae ad glandia quaedam, ea regione posita, pertinent. Quinetiam ab eadem magna uena, quae ad portas est iecoris, cuius soboles sunt omnes modo memoratae, aliae quoque quaedam producuntur, iocineris fibris numero pares, in singulas enim singulae diuiduntur.



GALENI LIB.

tur. Itaq; per uenas, quæ tum ad uenterculus, tum ad intestina descendunt, ad has ipsas portus cibus ascendit, eoque mihi locum ita uidentur antiqui nominasse. Hinc uero per uenas ad ipsius fibras pertinentes in totum iecur permanat. Indeque rursum in alias assumitur uenas, per gibbam quidem partem dispersas, cæterum a maxima alia uena ortas, quæ ob id ipsius cauam nominat. Ab ea etiam aliæ propagantur, quæ in omnes corporis partes sanguinem riuant. A iecore enim utrinq; prolapsa, sursum quidem per septum transuersum ad cor attollitur, deorsum uero in spinam dorsi contorquetur: atq; inibi super magnam desertur arteriâ, quæ a corde paulo altius, quam est septum transuersum, progignitur. Iam uero, uenæ ab ea quæ sursum tendit oriuntur istæ: primum ad ipsa præcordia coniugatio ramorum, deinde capillorum modo tenues permultæ tum in thoracem intercipientes membranas, mox in eam tunicam, quam scite, quod sit cordis inuolucrum, pericardion Græci nominat. Post illas alia mediocri magnitudine in dextram cordis aurem fertur. ab aure mox in sinum eius dextrum, eundemq; magnū. atque inde alia arteriis similē tunicā natā, in pulmones. Quin etiam alia quædā perquam exigua, per exteriorē cordis superficiem, in totum eius uisceris corpus spargitur. Eodemque modo in plurimis

## DE DISSECT.VENA. Fo.vj.

animantium ad thoracis sinistras partes profecta uena, quintaz dorſi uertebam ascendit. At in ſimijs paulo ſupra aurē cordis in dextris partibus ſita eſt hæc uena, per ſpinam quidem ſimiliter delata, cæterum in omnes thoracis partes diſfuſa, præter prima duo, nonnūquam uero etiam tria coſtarū interualla. Cum enim cor ipſum præterijt uena caua ad iugulū feſtinās, eam uenam obiter promit, cuius proxime mentionem fecimus: deinde alias quasdam filorum araneæ modo prætenues uenulas, ad mēbranas mittit thoracem interſepientes. Et quum ad id glandium, quem thymum nominant, prope iugulum peruenit, in duas diducitur partes. Atque ita in latus oblique utraque pars inclinata, a media regione paululū diuertit. De quibus dū ad ſibi uicinam quæq; clauiculam aſcendunt, tūz de alijs per anteriores thoracis partes procedentibus uenis, radices ſpargūtur. Præter has magnarum uenarum multiplici ſe ſiſſura ſcindentium coniugatio intercoſtalia ſuperioris thoracis alit ſpatia, et quæ circa ſcapulas ſunt loca. tūz nonnullos etiam ex interioribus colli muſculis. Porro ab his ipſis uenis illæ etiā naſcuntur, quæ ubi ad ſextā colli uertebam peruenerint, in ipſa foramēta ſe inſinuantes, ad caput uſque efferuntur. Quod autem de eis ſupereſt, quantūz id cūque eſt, ad axillas porrigitur. De qua

## GALENI LIB.

uena, quæ utrinque scilicet una est, ut de alijs  
 etiã, in dissectionũ libris plenius, & exactius di-  
 ctus est. Enimvero compendij causa ijs, qui pri-  
 mum instituuntur perutilis, nũc etiam aliquid  
 dicitur. Propago igitur utrinq; una, eaque præ-  
 tenuis, musculus qui a medio pectore ad humeo-  
 rum feruntur, distribuitur. Secũda in ipsa axil-  
 larum glandulosa membranosaq; corpora spar-  
 gitur, per exigua ea quoque. Tertia autem, cras-  
 situdine prædita mediocri, deorsus iter habes,  
 per easdem expanditur partes: utraq; autem per  
 suum thoracis latus deorsum uersus cum tenui  
 neruo porrecta, ad subchartilaginea usq; delas-  
 bitur. Quarta deniq; post has uena, iuxta eas,  
 quæ per axillam in manum fertur, exoritur, in  
 musculos dispensata, tum illos qui cauam scapu-  
 larum partem substernunt, tum eũ qui in ipsa  
 axilla est maximus. Cuius uenæ reliqua pars,  
 multiplici fissura, per manum excurrit totam,  
 ad hunc sane modum, Per brachia quidem ino-  
 timis magni musculi partibus, porrigit. (asp-  
 sumit autem ab hac uena nõ hic musculus solũ,  
 sed qui in brachio sunt fere oēs) Ex eius! au-  
 tẽ una propaginibus!, per interna hæc quoque  
 procurrens, circa brachium in orbem compli-  
 catur, posterioremque ipsius regionem ita per-  
 reptat. Mox in exteriores partem, eandemq; an-  
 teriorem, subit ad cutem. Atq; illinc deorsum tẽo



DE DISSECT. VENA. Fo. vii.

dit, donec ad brachii commissuram perueniat. Postrema uero eius pars aliquādo exterior ē brachii nodus paululū excedit: nonnūquam multo ulterius progredit, sub cute secundum os cubiti deorsum tendens. At omne quod de magna uena reliquū est, ad mediū peruēit cubiti flexū, una cū uiciniori neruo ramos expādens ad intimas musculorū eius loci partes, usq; ad interius brachii caput: nihiloq; minus per profundū ad posteriores, anterioresq; musculos. Sed em̄ priusq; in cubiti flexu ingrediatur, in uenas scinditur complures, e quibus multæ in superficie extāt: oīm maxima profundius demergitur. Ac quæ in superficie sunt, neque magnitudine, neque numero, æquales sunt. Non obscure enī, si laqueo brachii interceperis, etiam citra dissectionē uidere eas licet, in alijs aliter positas esse. Idq; in primis conuenit aspicere in ijs hominibus qui latiores uenas habent. quanq̄ in simijs quoq; quū dissecantur, eadem quæ in homine, omnia uiuantur. Atq; magna ex parte una quidem uena a magna propagatur, ad inferiora magis oblique declinans: ac subinde altera ex inferioribus cubiti partibus multiplici sparsa sobole ad nodum eum peruenit, quo cubitus extremæ manui cōmittitur: carpon Græci, Latini brachiale uocant. ac tertia deinceps, circa medium maxime cubitum, cæteruz earuz extrema prope brachia

## GALENI LIB.

le cōmiscētur. Elatissimus autē simul, & maximus ramus, qui ab ea uena, de qua modo institutus est sermo, propagatur, in mediū peruenit flexum, qua cubitus cūz brachio coit. Quo etiā confluit alterius uenæ, quæ per brachiū anteriora sub cute sita est, non exigua portio, quam in latas uenas habentibus perspicue uidemus: primum quidem a clauicula per ceruicis musculū sinuosius ferri, deinde uero recto tramite deorsum tendere. Huius uenæ quænam sit prima origo, posterius indicabimus. Nunc autem hoc tantum de hac scire conuenit, in superficie sub cute sitam, us quas percurrit partibus, uenas producere, ita tenues, ut uideri omnino nequeant. Vbi uero iam prope cubiti articulum producta est, non paruam sui partem oblique ad flexum brachiū, quæ in idem coeat cum modo memorata maioris uenæ parte: quā cum solā huc usque persequeremur, commētando propter societatem, quam cum alia inuit, in aliam transire coacti sumus. Dux enim hæ totius sunt manus uenæ, tūz ea, quæ per axillam in ipsam manū fertur: tum ea quæ per clauiculam, quam humerariaz appellāt. Sed enim de utraqz nosse oportet, non paruam utriusqz portionem semper ad flexum, qua brachium cubito committitur, pertinere. Caterum non semper eundem harum uenarū positum esse, sicut nec æqualis crassitudo



DE DISSECT. VENA. Fo. viij.

do semper est. Huius autē tres fere sunt differē-  
tiæ, quarum primā, quia in plurimis uisatur,  
primum etiā explicabimus: alias subinde profe-  
quemur. Secundū naturā maxime est, et in quā  
plurimis ita seres habet, ut utriusq; uenæ pars  
in interiores cubiti flexum quadātenus deferat-  
tur: quæ partes postea quam coierint, uenā pro-  
ducūt, quæ oīm in cubito extantiū fertur amo-  
plissima. Secundū hāc præcipua magnitudine  
humeraria est. Ea hic profecta, qua cubitus cū  
brachio coartatur, perque radius porrecta, ad  
extremi cubiti tuberculū, quod brachiali adhæ-  
ret peruenit: atque inde mox infimā, eidēq; exti-  
mā brachialis ipsius parti distribuitur. At illa,  
quā ex conflexu coituque duarū uenarum oīm  
in superficie extantiū maximā fieri dixi, ab in-  
terioribus cubiti partibus incipiens, primū con-  
scēdit radiū. Deinde in extimā euadit partē: ubi  
in ramos scissa duos, altero ad radiū extremum  
quod brachiali annectit, procedit: altero ad sum-  
mum pertingit cubitum, qua et ipse brachiali  
adhæret. Atque inibi uenam contingit, quā ab  
humeraria propagari retulimus. Ad hūc igitur  
modum secundū naturā fere sese habent duæ  
hæ uenæ. quanquam in aliquibus non item: in  
quibus uel humerariæ propago axillariæ ramū  
auget, uel uiceuersa huius ramus humerariæ.  
Quinetim, quod ad situm pertinet, altera eorū



## GALENI LIB.

rum sub musculum se condente, reliqua sola in  
superficie eminet. Ita fit, ut dum ad uenā secū  
dam accedimus, uel tres æquales uidere liceat,  
uel duas tantū, uel inæquales omnes: nonnunq̃  
etiā nobis occultetur aliqua una ex ijs, aut etiā  
duæ. Atqui & quæ has ordine consequuntur, hu  
miliores tres, eas non solum æquales, inæqua  
lesq̃ uidere licet, sed ne extantes quidem prors  
us earum aliquas. quod eo fit, uel quia prates  
nues ipsæ sint omnino, ut sensum effugiant: uel  
quia penitus ferantur, maxime cum obesus,  
crassiusque fuerit corpus. Tam uero quemadmo  
dum que in interiori cubiti parte sunt uenæ, fe  
re circa brachiale in multas exiles, et inter se cō  
mixtas uenas scinduntur: sic etiā, multoq̃ his  
magis, quod liquido uel in dissectione, uel etiā  
citra eam uideas, exterioris cubiti partis uenæ.  
Pluribus enim locis & sibi inter se obuiā fiūt,  
& cum uenis coeunt exterioris cubiti partis. At  
que ad hunc modum sæpius commixtæ, sub cu  
tem extenduntur, quæ brachiali, palmæ, digi  
tis deniq̃ obducitur. Ac uenarum in summa cu  
te extantium huiusmodi est series. Quæ autem  
altius per cubitū, manumq̃ extremam immer  
guntur, a duabus magnis (quarum sobolem es  
se diximus omnes per totam manum diffusos ue  
narum ramos) oriuntur, ad hunc sane modum.  
Qua parte, ut ante meminim⁹, ab utraque ma  
gna propagari

# DE DISSECT. VENA. Fo. ix.

gna propagari quasdam ostēdimus, quæ ad flexum brachij tenderent, duo rami ab utraq; sin-  
guli in profundum procurrunt: ibiq; similiter  
mutuo complexu coniunguntur. Ex quibus rur-  
sum aliæ duæ uenæ fiunt mediocri amplitudi-  
ne, quarum quæ demissior est, ad partes brachij  
internas traicitur. elatior autem altera, per me-  
diā crassitudinē quadatenus progressa, ac fere  
ex interioribus partibus cōmune ossiū uinculū  
contingens: postea uero, cū iam attigerit parū  
musculus obliquius propter brachiale positū,  
qui radio mouendi author est, in exteriorem il-  
lius partem euadit. Atque inibi per profundum  
porrecta, exterioris manus quæcunq; nata fue-  
rit ossa, amplectitur. Ea porro, quam ad interio-  
rem manū pertēdere diximus, ad paruos usque  
digitos, aliquid etiam de medio digito apprehē-  
dens, pertingit. Reliquam uero mediū partem,  
ac duos deinceps maiores digitos, una cum e re-  
gione positis palmæ, ac brachialis partib; alia  
āplectitur uena, ab ijs orta, quæ in superficie exo-  
tant: ac uenæ quidē per manus ita digeruntur.  
Quæ autem ad anteriorem thoracis regionem fe-  
runtur, ad hunc constant modū. E medio dua-  
rum uenarum, in quas cauam findi dudum me-  
morauimus, uena oritur, quæ ad dextram ossis  
pectoris tendit: ab sinistro autem caua membro  
altera. Hæ igitur per totum feruntur thoracē,

## GALENI LIB.

ossi pectoris subdita, usque ad radicē eius char-  
 tilaginis, quæ in mucronē gladii modo exacui-  
 tur, ob idq; a Græcis ξιφοειδης appellatur:  
 Et ad singula obiter costarum intervalla ramu-  
 lum ex se mittūt, quo coniungūtur extremis ei-  
 uenæ, quæ spatia ipsa intercostalia perreptat.  
 Harum uenarum pars quædam extra thoracē  
 emargit ad substratos illic musculos. Ipsæ au-  
 tem, quæ ad mucronatā chartilaginē pertinet,  
 tum in mammas assurgentes, tum in reliquum  
 pectus dispēsate: deorsus procurrūt, rectis sub  
 nixæ musculis, in quos partem etiamnum quan-  
 dam emittunt. Vnde nō modica earum portio in  
 idem coit, cum uenarū aliarum postremis, quæ  
 de imo sursum attollitur. De quibus posterius  
 dicetur, euz de uenis in osse, quod latū uocant,  
 existentibus, sermonē instituemus. At uero aliæ  
 quoq; sub cute, quæ sub chartilagineis praten-  
 ditur, eminentes uenæ initium habent, ex com-  
 mixtione facta ramulorū, tū ab iis uenis, quas  
 iuxta mucronatam chartilaginē extra thoracē  
 cez existere, atque emergere diximus: tum etia;  
 ex iis quæ uicina intercostalia alunt. Cum qui-  
 bus aliæ sursum committuntur quæ de inguini-  
 bus ad superiora tendūt. De quibus suo loco dis-  
 feretur. Adhūc igitur modum uenæ distribuū-  
 tur, quæcunq; a caua bipartito scissa propagan-  
 tur, prius quaz ad clauiculas pertingant, maxi-



# DE DISSECT. VENA. Fo. x.

me circa eum locum, ubi magnū situm est glandium, Anatomicis thymus appellatū. Vbi alie etiamnum uenæ parue, et in ijs tela aranearū modo prætenues aliquæ, tū in ipsum glandiū, tum in obsepiētes membranas inseruntur, quæ et ipsæ, cauæ sunt soboles. Aliquæ autē his etiā maiores, et ad membranaceum cordis inuolucrum (pericardium Græci uocant) proficiscuntur: et cū arteria, quæ a corde sursum effertur, se porrigūt. Qua porro clauiculæ adiacēt cauæ uenæ membris, in quæ secari ipsas ostendimus, subiecta est uenæ radix maxima, utrinq; una: quæ quidem confestim assurgēs, bipartito scinditur, duas edens magnas uenas: quarum altera per anteriorem, aduersamq; colli partem ad interiora magis recedēs effertur: altera in partem anteriorem deorsum quadantenus subsistens, mox sursum sublata clauiculam amplectitur ad modo memoratam uenam extrinsecus cōtendens. Et confluentibus, seseq; commiscentibus, gigni in summo eminēs iugularis utrinq; una. At enim nō eodē semper modo miscentur, sed aliquando haud longe ultra clauiculam progressæ, nonnunquam tum demum, cum tertiā totius colli longitudinis partes emensa fuerint. Videre autem aliquando eas licet ad mediā longitudinem, aut non ita procul pertingentes: aliquando ne edita quidem uena ulla sursum redior

# GALENI LIB.

res efferrī uideas, modico inter ipsas spatio inter  
iecto: et parte quidē interiore nō procul ab aspe-  
ra arteria alterā, exteriorē uero reliquam, eam  
nimirum, quā circa clauiculā contorqueri, et  
circumuiolui diximus. Ceterum cōmunis uenae  
interuentu, quae transuersum ad utranq; obli-  
quet situm, perpetuo inter se coniunguntur: atq;  
ita sursum uersum contendunt. Iam ea uena,  
quam circa clauiculam torqueri dixi, propagi-  
nes mittit aliquas filorum araneae modo prae-  
tenuēs, quae in nullis omnino corporibus uisu per-  
cipi queant. id enim omniū huius generis uena-  
rum commune est. Nonnullas in speciem capilo-  
lorum graciles, easq; aspectabiles, si modo con-  
festim dissecetur animans, ut compressu digito-  
rum, expresso in ipsas sanguine, ita manifestas  
efficiamus. Duo autem hic huiusmodi uenarū  
sunt coniugia: obliquum alterū, coeuntium ip-  
sarum, ac sese inuicem contingentium in cauo  
iuguli: alterum autem, minime coeuntium. decli-  
nant enim quasi in extimā colli parte obliquae.  
Porro ex ijs, quae filorum araneae modo graciles  
sunt, quaecunq; in extimā regionem conuer-  
tuntur, earum extrema inuicē coniunguntur.  
Haec igitur, sicut iam dixi, nō in omnibus sunt  
aspectabiles. De ijs autem, quae usquequaq; ui-  
deri possunt, tres sunt origines ducentes ab ea,  
quae circa clauiculam contorquetur. una quidem

DE DISSECT.VENA. Fo.xj.

fatis notabilis, quæ sæpius æquali uisitur crassitudine, cum uena ad collum subeunte. hanc autem humerariã ideo appellant, quod obliquior a clauicula sensim recedens se porrigat ad humerus. Reliquæ duæ, radices utrinque humeraria minores habet. Earũ igitur altera, elatiorẽ nata radice, usque ad summũ humerum conscendit, ac in proxima quæque corpora transiens, ita occultatur. Humilior ac depressior altera, per profunda magis surreptans, secundum magnũ musculũ ab osse pectoris porrecta, ad caput brachij peruenit. Cuius uenæ postrema aperte nonnũquam uidentur committi cum uenæ alterius extremis, quæ ab axillaria nascens ad humerũ extollitur, atque illic multifariam distribuit. Quin aliæ quoq; modicis interuallis sparsæ, quarum non idem perpetuo situs, neque uero magnitudo plane eadẽ, in omnibus similibus uisitur: a uenis oriuntur, quæ ad manus pertinent. Quæ autem ex ijs notatu dignæ sunt, dudum memorauimus, cum de axillariæ dissectione commentaremur. Ea enim et multo humeraria maior est, et numerosam in brachio sobolẽ habet, prodeuntium ex seramoru: cum ab humeraria per paucæ, eaq; uel pilorum in modũ, uel etiam filorum araneæ pratenuẽs oriantur sub summa cute dispersæ. Sequitur ut de iugularijs, tã ijs, quæ subter cutẽ extant, quã de illis etiam, quæ



## GALENI LIB.

altius condita deliteſcūt, quo eā modo digerā-  
tur agendū ſit. Iugularias autem altius condi-  
tas, nōnulli eas uocāt, quæ protin⁹ ſciſſa cauā  
producentur. Alij nō totas illas, ſed id demū,  
quod ex ijs ſupra iugulū collo intextū eſt. Nec  
deſunt, qui ne hoc quidē omnino ſciant, illas in  
ramos ſpargi infra clauiculas. Nos uero ſemp  
obſeruauimus cauā uenā, prius quā ad clauic-  
ulas pertingat, diduci: et de ramo ipſius utro-  
que uenas produci, quæ ad ped⁹ primasque co-  
ſtarum intercapedines, ſex colli uertebbras, ſca-  
pulasque ferantur. tūz quæcunque poſt has ad  
totas manus deriuātur, quas per axillas eo iter  
habere diximus. Cum autē ſub clauiculas pro-  
dierint magnæ uenæ, quas ex diſtractione cauæ  
in duo ueluti membra oriri dictum eſt, radicez  
edūt notabilē: a qua, ut memoratū eſt, tū hume-  
rariam naſci contingit, tū alias, quoq; quaſdā,  
de quibus eſt paulo ante pertractatū. Quantū  
autem eſt reliquū de magnis uenis, in quas ca-  
uam diduci diximus, recta per collum, gulam  
habens ante ſe poſita, ſurſum effertur. De qui-  
bus, quo pacto diſtribuantur, orationis ſeries  
poſtulat, ut nunc agatur, una cum ſummo exo-  
tantibus iugulo uenis, quas in diuerſis corpo-  
ribus uarie concurrere eodem, et coniungi in-  
ter ſe diximus. Enimuero quemadmodū huius  
rei, ut in unum coeant, permultæ ſunt diſſeo-

## DE DISSECT. VENA: Fo. xij.

rentia: sic alijs, totidem differentijs ipse in ramos scinduntur. Progressa enim superficialia ipsa iuguli uena, protinus aliquando finditur: et ipsa ipsius utraque, uel æqualis apparet, uel inæqualis: nonnunquam ulterius multo procedit: aliquando ita longe, ut propter maxillam scindatur. Hæc autem conspicue in hominibus quotidie uidentur, uel in curationibus, quæ manu obuertuntur, uel si etiã intensius clamauerint, spiritum ue intra continuerint compresso thorace, quod athletæ in spiritus comprehensionibus (ita enim uocant) faciunt. Quin et putrifica quædam uitia, ita alio quando extenuata cute omnia quæ suberant, detexerunt, ut nudæ conspicerentur uenæ. Id quæ per omnes continenter corporis partes uidere tum maxime licuit, cum scdæ quædam lues carbunculorum in Asiam ingruisset: quæ facile, quicunque uidissent, persuasit, exactas similes cum hominibus esse similitudinem. Igitur medicum necesse est, quicumque curationem circa collum manu facturus sit, uarietatem nosse uenarum, quæ collo sunt commissæ: tum uero omnes quatuor uenarum propaggines ad unguem exploratas et cognitatas habere. Quum autem quatuor dico, intelligi uolo primum eas quæ infra sunt, prius quàm eodem coeuntes, extimam producant iugulariã. Deinde eas, quæ postquam scissæ in ramos fuerint, sursum uersus contendunt. Nec uero necessariũ ar-



# GALENI LIB.

bitror, nec medicis, neque ijs qui primū intro-  
ducuntur, nec multo etiā magis nobis, optime  
Antisthenes, philosophis, exactissimaz habere  
huiusmodi rerū cognitionem. Quocirca initio  
statim testatus sum me commentariū ac compē-  
dium scribere uasculorū dissectionis. In libris  
etenim, quibus rationes perscripsimus admini-  
strandarū dissectionū, quomodo in quēque mus-  
culū uena et arteria infereret, planū factū est.  
Nunc autē nec est, ut dixi, necessariū, et mulo-  
tū haberet obscuritatis ratio, si mihi musculorū  
facienda esset expositio. Ideoq; in dissectionū li-  
bris, uasculorū tractatui, musculorū dissec-  
tio nōn prēmisi. Quapropter, quod ad præ-  
sentē commentationē pertinet, tantū dixisse sa-  
tis erit, quod uenæ ab extantibus in superficie  
iugularijs ppagatæ, plurimæ, et tennes sunt,  
et in musculos subter cutem positos diuiduntur.  
Ex quibus musculis etiā duo sūt, qui buccas  
(Υαθους Græci appellant) mouent, tennes  
illi quidē mediocriter, ceteri subter totaz colli  
cutem porrekti. Postea autē, quā iterū in ramos  
discesserint ad superiora subeuntes, harū uena-  
rum notabiles rami sunt, per quos tū in totam  
faciem sparguntur, tum in circūiectā auribus  
regionem se expandunt, et in caput denique at-  
tolluntur. Cū enī bipartito se sciderit utraque,  
altera quidē pars in totā inferiorem maxillā ma-



# DE DISSECT. VENA. Fo. xliij.

gnis uasis, & alijs paruis in superiorē effunditur: altera uero circum aures, caputque excurret. Permiscuntur autē harū omniū uenarū extrema, nō modo cū adiacentibus, uerū etiā nō hilo his minus cū eregione positis. Eodez enim confluunt uenarū ad sinisteriorem existentium partem capita, cum ijs quæ ad dextram sitū habent. Nam cū quatuor in summo extantes iugulariæ, prodierint, ipsarū quædam per exteriora magis in caput subit. Memineris autem eius quod de ea dixi, nimirū circa clauiculam cōtorqueri. Alia interius ad inferiorē maxillā, commixta identidem ramulis quibusdā interioris iugulariæ, a quibus multæ mittuntur propagines in guttur, gulamque, eas denique musculorum partes, quæ per profundū iugulū porriguntur. Sicut quæ ab imo ad cutem recedunt partes musculorū, iugulariis aluntur ijs, quæ subter cutem magis eminent. Quin & lingua magnas accipit ab intimis iugulariis uenas, postea quæ eæ per ramos cū extimis se coniunxerint. Quæcunque porro linguæ circumiecta sunt corpora, & e musculis quicunque nō penitus conditi latent, a iugulariis aluntur extimis. Reliquū autē omne ex internis iugulariis ad cerebrum assurgens, in caluam excidit, per extremam suturæ partem, quæ Δ Græcæ literæ imaginē ostendit. Sed prius quam excidat, ramulū in mediū pri-

# GALENI LIB.

ma, secunda que uertebra commissura inserta: ac deinceps alia pili modo tenuem inter primam uertebra, caputque ipsum. Coit autem cum uenis quae de summa parte deorsum feruntur per cerebrum: ac nonnullis iteque, quae extrinsecus, quaeque a lateribus ueniunt. Omnium enim coniunguntur extrema uenarum circa caput, ipsiusque cum prima uertebra commissura. At enim uenarum quae calua intexuntur, aliqua per interiora procedunt, maxime quae maxilla iungitur. Quemadmodum autem postea, quae in calua euaserint, in ramos sparguntur: et societate inter se ineunt: ac rursus quomodo aliqua ipsarum partes cum nervis quibusdam foras excedunt, in dissectionum libris (cum de cerebri dissectione facienda differuimus) pertractatum est. Similiter cum de pulmonibus, corde, aliisque uisceribus dissecandis orationem instituemus, ut quaeque in quodque ipsorum ab omnibus, tum uenis, tum arteriis propago mitteretur, plenius atque exactius est dicendum. Nunc autem (quod iam monuimus) commentarium ac compendium de uasorum dissectione scribimus. Cumulata igitur, expletaque uenarum, quae superiora alunt expositione, iam ad reliquas oratio conuertatur, quae omnibus infra praecordia membrorum, partibusque corporis sanguinem uiuant: quarum omnium origo cauda est. Haec enim uena, simul atque eiecore primum se exprimit

DE DISSECT.VENA. Fo. xiiij.

psit, priusquam in lumbos confidat, elatior ad  
huc existens, parte quidem dextra in dextri rea  
nis tunicam, ac circumiecta corpora modo in spe  
cies filorū araneæ prætenues, modo crassiuscu  
los paulo & aspectabiliiores ramulos spargiti  
sinistra autem, insigni magnitudine uenam,  
quæ & ipsa in ramos scissa corporibusinibi ext  
stentibus distribuitur: ac sæpenumero a caua  
ipsa ad renem proficiscente propagines mittun  
tur, quæ in renis tunica intexuntur ac uicinis  
in ambitum locis: eaq; nunc filorum araneæ si  
miles sunt, nūc parua. Paruas autē separatim,  
ac proprie appello, quæ aliquā & exiguā cras  
situdine obtinent: id quod nequaquā inest neq;  
in iis, quas filorū araneæ, neq; in iis quas capil  
loruz similes subinde uocamus. Verum illæ qui  
des assimiles sunt subtilissimis lineis, quæ agre  
uident: quas antiquorū nōnulli *απὸ τοῦ οὐ* s  
uocauere, quasi tu exolescentes lineolas diceret.  
Hæ autem pleniusculis paulo lineis, quæ habet  
illæ quidem latitudinē omnino aliquā: cæteruz  
quia sensum non moueant, ceu quiddam latitu  
dine uacās uulgo dicuntur, cū nulla in iis partit  
eula sit quæ manifeste eaz dimensionē definire  
queat. hæ igitur uenæ ad hunc habent modū  
Quæ autem in renes inseruntur, omnium faci  
le sunt amplissimæ, quæ cunque a caua propa  
gantur. Deinceps post has, ad testes deferuntur.



## GALENI LIB.

uenæ, quæ partim cōmune quiddā in omnibus  
 natæ sunt simus, partim in singulis propriū.  
 Et cōmune istuc quidē est, ut ab ea, quæ ad si-  
 nistrum perfertur renē, ramus ad uenam eam  
 mittatur, quæ ad sinistrum testem tendit: ut  
 quæ hæc a caua propagetur, aliquando ab illa  
 sola, quæ ad renē perfertur. At, quæ in dextra  
 parte uena est, ad dextrum contendens testem,  
 ea ab ipsa producitur caua. quāquā hæc quoq;  
 mihi semel obseruata est, initia duo habere, si-  
 cut ea quæ ad dextram est, per sæpe. Hæ igitur  
 uenæ ad testes deferuntur, siue mas, siue fœmi-  
 na animans fuerit. habet enim etia; fœmina ad  
 uteri latera testes multo minores, quam in mar-  
 ibus uisuntur. Secū dū eas uenas de singulis uero  
 tebris ad ilia uenæ mittuntur, quarum postreo  
 ma ad musculos, qui abdomini prætēti sunt, at-  
 tolluntur. musculi enim quibus abdomen cono-  
 stratum est, ab ijs aluntur uenis, alijs que tum  
 quæ inter minorum costarū spatia uersantur,  
 tum quæ per pectus ad mās superne deferū-  
 tur: ijs denique, quæ de inferioribus locis supe-  
 rum uersus tendentium extrema, cum proxime  
 memoratis pectoris, mammarumque uenis con-  
 iunguntur. de quibus antea recepi merunus di-  
 cturum. Qui porro supra hos musculi, extra  
 thoracem iacent, alimentum accipiunt a uascu-

DE DISSECT. VENA. Fo. xv.

lis gracilioribus: de quibus ante est dictum. tum  
etiā ab ijs, quæ per pectus ad mamas tendūt:  
(Siquidem eorū propagines quædaz ad muscu-  
los pectoris erumpunt. ) Atq; etiā ab ijs quæ in  
spatius sunt intercostalibus. Etenim et harum  
pars quædaz extra thoracem emergit. Ac dictū  
quoq; prius est, quod a uena caua lumbos pero-  
repante uenæ propagate in spinā dorsi, quate-  
nus ea per lumbos porrigitur, inseruntur, per  
singla forāmēta singulæ, plane ut nulla uena  
quæ a caua ortum habeat supersit cōmemorandā.  
Sed enim quo modo bipartito ea scindatur,  
iam addendū. In ultimis igitur lumborū uerte-  
bris, non amplius uidere est arteriā uenæ subie-  
ctam, sed contra omnino se res habet. Elatior  
enim arteria supra uenaz ceu prouehitur: uena  
autem per ipsas uertebras. Hac igitur parte et  
se se contingit utrunq; uas, et in duo membra  
diuaticatur: efficiturq; omnis illorū figura Ve-  
lamento per similis. Vtraque porro coherentia  
uasorum pars, ad sibi subiectuz crus descendit  
obliquior. Atq; obiter uidere primū licet, ramū  
uenæ utriusq; retrorsum ad carnes in lumborū  
longitudinē porrectas († oas Græci uocāt)  
distribui: atq; alias pilorū similes obscure quā-  
doq; ad eā pitonæi partē, quæ ad lūbos est, fero-  
ri. Siquidem peritonæū, ut cuiq; corporis paro-  
ti prætenditur, a proximis quibusque uasis, tā



## GALENI LIB.

frequentibus alitur uenis: quarum plurimas eas  
 que longiores, a uenis accipit, quæ ad testiculos  
 deferuntur. Secundum has, a uenis ad crura tende-  
 tibz propagines mittuntur, cum ad imas, tum ad  
 anteriores partes: primum quidem ad eius ossis,  
 quod latum uocatur musculos, quarum non exigua  
 portio, ipsorum miscetur musculorum exortui ad  
 sedis musculos tendens. Vtriusque autem uenarum  
 coniugationis extrema ad exteriores lati ossis par-  
 tes se promunt. Inque musculos eam regionem con-  
 sternentes dispensantur. Deinde ad uteri par-  
 tes inferiores, uenæ progrediuntur, paulo su-  
 pra quas est colli primus exortus, quæ in cerui-  
 cem ipsam disseminantur: et ad uterum coeuntes,  
 quadam sui parte testiculos amplexantur. altera  
 usque ad uteri fundum pertinet. At ex his quæ ad  
 inferiora uteri feruntur, uenæ propagantur ne-  
 ficam subeuntes. Deinceps aliud uenarum quæ ge-  
 mino ex magna parte initio oriuntur, coniugium  
 est, quæ procedentes mutuo se contingunt, uen-  
 namque progignunt, quæ utrinque per pubis  
 os ad exteriora cum eius neruo porrigitur: atque  
 ita ad inferiores ossis quod ad pubem est muscu-  
 los, uasculum hoc, ut neruus quoque distribui-  
 tur. Est et alia subinde uenarum coniugatio, de  
 quibus antea dicere intermiseram, quæ per res-  
 tos musculos ascendunt: deinde extremis con-  
 iunguntur uenarum, quas per thoracem descende



DE DISSECT. VENA. Fo. xvjs

re ad subcartilaginea prius dixi. Quinetiam  
ab eadem radice uenulae utrinque singulae, in  
uterum perferuntur, per quas uenas mammas cum  
utero maxima est communicatio. Vena igitur haec  
interioribus rectorum musculorum partibus sita  
est: ac illa quidem quae ad subcartilaginea fertur,  
his sunt connexae. Insuper aliud extra mus-  
culos est coniugium, earum quae ad pudenda per-  
tinent, siue mas sit animal, siue femina. Descen-  
dunt autem propter commissuram duorum pubis os-  
sium, utrinque. Ab his autem statim alia est uena  
utrinque quae ad crura procedit ad inferiores mus-  
culi partes. Sequitur alia post has uenarum sub-  
ter cutem in superficie extantium coniugatio, quas  
in macilentis hominibus conspicue uidemus,  
de inguinibus primum orientes per ilium regionem asce-  
dere. Quinetiam obscurae aliae, quae superne deor-  
sum feruntur, finibus has contingunt. haec au-  
tem ab istis quae ad mammas sunt, maxime deri-  
uantur. Sed enim ubi a uenarum coniugatione,  
de qua modo erat sermo, dixi non paruum partem  
ab inferioribus sursum tendere, ac ad podicis  
musculos secedere. Hinc reliqua magna uena,  
in crus ipsum diuiditur: primam iuxta inguina  
emittens propaginem, quae cum parua arteria in an-  
teriores musculos spargitur: secundam utrinque  
unam, quae ex internis partibus ad genu usque  
subter cutem dissipatur: ac alias non paucas pere-

## GALENI LIB.

profundiora fœmora. Caterū paulo altius quā  
 fœmur, cū tibia articulo iungitur, in tres par-  
 tes diuiditur: quarū media (quæ maxima est)  
 per ipsum deorsum ad poplitem fertur, atq; in-  
 de per profundū posterioris tibiæ (quam surā  
 dicūt) procedens, nō modicā in mūsculos eius ra-  
 morum sobolem spargit. Altera autem parte,  
 quæ in superficie eminet per exteriorē partē al-  
 terius tibiæ ossis (quod peronam Græci appello-  
 lant) porrecta, ad pedis pertingit articulum.  
 Tertia uero quæ est interior ad anteriorē tibiæ  
 partē (creā Latini appellant) procedit, ac ino-  
 de ad malleolos peruenit, ad ipsum tibiæ extre-  
 mum: hæc ad sanguinē mittendū cōmodissima.  
 Enimvero a maxima quæ per profundū mūs-  
 culum distribuitur, duo cum arteria, extre-  
 ma fiunt: quorū alterū maius id quidem a tibia  
 fertur ad interiora: alteruz uero per mediā duo-  
 rum tibiæ ossium regionē ad interiora pedis per-  
 ducitur, ac propagini alterius uenæ immisceo-  
 tur, quam ex anterioribus tibiæ partibus, per  
 posteriorem tibiam dixi descendere. Ita fit, ut  
 sint uenæ quatuor, quæ ad pedes descendunt:  
 una quidē omniū maxima, per externā posteo-  
 rioris tibiæ partē: altera per ipsius interiorē. Et  
 tertia, ut dixi, per anteriorē tibiæ regionē. quar-  
 ta denique quæ ex interioribus partibus exu-  
 berantes ossium tibiæ processus complexa est.

Harum

# DE DISSECT. ARTE. Fo. xvij.

Hæc igitur duæ prius expositæ, posterioris sunt tibiæ: reliquæ duæ, anteriores. Hinc uero quarta infima quæq; pedis cõmixtis tibiæ priæ particulis cõplexatur. duæ autẽ intermediæ per superiores pedis partes disseminantur. Atqui prima etiam superioris pedis particulã hz: ac ptes minimo digito maxime uicinas cõplectitur. Cæterũ et alijs multis modis quemadmodũ in extremis manibus, sic in pedibus etiam uasorũ particulæ commiscetur. Hoc igitur tibi disseccionis uenarũ cõmentarium esto. Deinceps de arterijs dicẽdũ. Harũ origo est cordis sinister uentriculus. Hinc autẽ in pulmones deriuat una tenuis, simpliciq; tunica cõstas: tũ altera etiã multo hac crassior, quæ ueluti trũcus est omniũ arteriarũ. Possis etiã, si lubet, quæ in pulmonẽ deriuat, cũ uena cõferre, de qua omniũ primũ differuimus. eã dico, quã a portis iocineris ad uentrẽ numerosa ramorũ serie descendere, suisq; extremis ceu radicib⁹ quibusdã cibũ exugere dixim⁹. Hæc enĩ similiter propter usũ, cõmoditatẽq; spiritus attrahẽdi, in pulmones deriuatur. Ac sane ob eãdẽ hãc causas, cordis ipsi⁹ corpus circũfusus in ambitũ duas habet arterias: alterã quidẽ maiore, quæ maximã ipsius partem amplectitur: alterã ea maxime regione distributam, ubi tertium uentriculũ esse existiauit Aristoteles. Atqui hic in latiore cordis parte iacet, particula existẽs dexteroris uentriculi, nõ etiã alijs quis



## GAIENI LIB.

piā tertius uentriculus. Has igit̃ arterias, simul  
atq; maxima de corde se prompserit, ab ea produ  
ci uideas: ipsamq; mox in membra haud quaquā  
paria diduci: & horū quidē quod minus est, sur  
sus ferri: ipsumq; cōfestim in partes rursum in  
quales findi. ac subinde ipsarū maiore ad iugulū  
tendentē obliquas de sinistra ad dextrā thoracis  
partē porrigi: alterāq; oppositū habere fitū. Attol  
litur enī etiā ipsa obliquior ad sinistrā scapulā,  
& axillā, ppagines mittens ad pe<sup>ct</sup>, primasque  
thoracis costas, & ad sex colli uertebras, atque  
etiā ad clauicula uicina loca summo humero teo  
nus. Ac cū has oēs ediderit, reliquū ei<sup>9</sup> i scapulā,  
manūq; diuidit. At uero arteriæ pars maior, quæ  
ad iugulū tēdit, ubi ppe glandiū, cui thymo nos  
mē est, peruenerit: primū quidē, ad sinistrā iugu  
larē ramū emittit: post illū, alterū ad dexteriorē.  
Deinde quicquid ipsius restat, eodē distribuitur  
modo, atque illa, quā ad scapulā, axillāq; finio  
strā procedere diximus. Nā & ad pectus quædā  
nō aliter ac uena, porrigitur, tū alios producēs ra  
mos, tū eū qui mammā subit. Et quæ ad primas  
thoracis costas diuiditur, extraq; thoracē emer  
git ad spinales musculos nō alio, quā uena, mo  
do: quæq; p foramia sex primarū colli uertebrarū  
deducta, una cū uena ad spialis medullæ mebras  
nas (meningas dicūt) descēdit, diuiditurq;: ituz  
quæ ad sumū humerū, scapulā, axillāq; dextrā:

# DE DISSECTARTE. Fo. xviij.

hæ in quâ, omnesq; aliæ simul cū adiacētibus uen-  
 nis diuiduntur. quæadmodū & quæ arteriæ caro-  
 tides appellātur. Ex ijs enī una cū iugularijs in-  
 ternis ascendit quædā arteria. Cæterū quæ in su-  
 perficie extāt iugulariæ, siue duæ sint, siue qua-  
 tuor, eæ siue arterijs conspiciūtur. At oē, quod ex  
 carotidib⁹ est reliquū, sursum recta procedēs pene-  
 trat in caluā: inibi quæ textū illud ad retis imago-  
 nē cōplicatū efformat: deinde in duas rursum coiēs  
 arterias, subit ab cerebrū. Cæterū, quæ eā pãto  
 distribuātur, quāq; cū sensuū instrumētis socie-  
 tatē, ac cōmunionē habeāt, ī dissectionū libris est  
 mōstratū. Porro arteriæ, quæ a corde se promit,  
 pars maior, ad spinā defleātur, quintāq; thora-  
 cis uertebra ascendit: & inde per totā spinā usq;  
 ad latū os descendit: primū propaginē quandā te-  
 nuē emittēs, quæ in eas diuidit thoracis partes,  
 quibus pulmōes adiacēt. Extrema autē ipsius ad  
 arteriā usq; ascendūt: deinde per singulas uertes  
 bras rami, tū in spatia intercostalia, tū ad spinā  
 exoriūtur. At enī superiores thoracis partes, quæ  
 quatuor primis costis muniunt, nō ad eundē sem-  
 per modū distributas habēt arterias. Aliquando  
 enim ab una costa lōgiusculē recedūt arteriæ, nō  
 nūquā pari ab utraq; spatio intra ipsas inserunt.  
 Cæterū magna arteria procedēs, simul atque tho-  
 racē egressa est, primū duas in septū transuersus  
 mittit arterias: deinde in uētrē, lienē, ac iecur ino-



# GALENI LIB.

iuges unā: utraque ab anterioribus magna arteria  
 partibus, ducētes originē inter dū ex una radice bifa-  
 ria diducta, uētri quodē, et licī, et hepatis altera per  
 altera uero intestinis distribuit, per duo mesenteria, tū  
 id quod ad dextrā sitū habēs, prius est coli partitū, tū  
 id, quod est omnium intestinorum mediū. Nā tertiū mesē-  
 teriū, quod prope sedē pertingit in sinistra sitū, nul-  
 lā idē assumit arteriā, sed de imis partibus in ipsū  
 quādam inserit, quā propter renes a magna arteria  
 iniugis ex ipsa nascit. Atque inter hanc et mō memo-  
 ratas, duae magnitudinis praecipua ad renes tēdūt.  
 Tū alia quoque praeter ipsas arteria supne atque a  
 sinistra per uenā porrigit, quā ex inferioribus partibus  
 sursum uersus tēdit. Eni uero ex duabus incōiugatis  
 arteriis, de quibus mō uerba fecim⁹, aliquoties uidis-  
 mus altiorē quidē in uētriculū, lienēque: humiliorē  
 uero in iecur mesenteriaque distribui. Quā alia quoque  
 a magna propagata arteria per singulas uertebras, in  
 spinā dorsi una cū uenis descēdūt. Ac cū uis etiam  
 uenis, quas ad ilia ferri meminim⁹, arteria pari-  
 ter quādam cōtēdūt, ab ea magna orta, quā per lū-  
 bos extēdit. Denique cū uenis, quas ad testes dixi-  
 mus ferri, arteria etiā procurrūt. Iā arteria mas-  
 gna pars extrema, cū ad latera lūborū puenerit,  
 suprapositā uenam trāscēdit. Ostēsus enī nobis  
 est, sup uertebras uenā, sup hanc autē ferri arte-  
 riā. Quod postea quod factū fuerit, haud aliter quod ue-  
 na scissa bipartito arteria, par tē utraqque in sibi sub



# DE DISSECT. ARTE. Fo. xix.

iedum crus mittit. Quæ dū ita ferūtur, obiter ab  
 ipsarū utraq; singuli cōspiciūtur ppagati ramuo  
 li, q̄ cōceptib⁹ p umbilicū inserūtur. Cū enim cō  
 summat ac pficiť animans, quidqđ mēbranaceū  
 in medio est, aridū id, et inutile reddit: quod autē  
 umbilico adhæret, nequaq; perit. Atq; indidē ut  
 in cōceptib⁹, sic etiā i iā pfēctis animātib⁹ arteriæ  
 aliquot ppagatæ, cū uenis ad os latū existētib⁹ pa  
 riter excurrūt: quas antea dixim⁹, in regionis ei⁹  
 musculos dispergi. Ipsa aut cruris utriusq; arte  
 ria, ad itimas distributa ptes, cū magna uena fer  
 tur. Ac sane quæcūq; ab ea uenæ pducunt, pfun  
 dius cōditæ, cū arteriis ferūtur pariter, atq; i ra  
 mos dissipātur. Cæterū ijs uenis, quæ p crurū su  
 perficiē extāt, ne unā qđē aiā uertas adiacētē arte  
 riā. Sic nec in manib⁹, nec abdomine (epigastriū  
 Græci appellāt) nec dorso, nec collo. Sed enī arte  
 rias in solo capite iuxta cutē inueneris, tū eas quæ  
 post aures, tū eas quæ ad utraq; tpa extāt. Nam  
 quæ in extremis manib⁹ arteriæ sūt, eæ etsi pfun  
 dius lateāt, pulsare attamē manifeste sentiūt: qm̄  
 ea loca min⁹ sunt corpulēta: quēadmodū etiā il  
 læ, quæ p pedū malleolos excurrūt. Nā uel in ijs  
 hoibus, qui crassiore obefioreq; sunt corpore, eæ  
 paululū sentiunt, cū aliarū nulla manifeste pciō  
 pi possit. Etenī in macilentis etiā aliarū pluriū ar  
 teriarū particulæ, sensuz minime fugere queūt.  
 Hæc igit oīa, quæ adhuc de uenis arteriisq; dicta

## GALENI LIB.

sunt, in pfectis uisunt animatibus. At in cōceptio-  
 bus, præter iā memoratas in ipso fœt<sup>o</sup> inuolucro,  
 quod choriō Græci uocāt, uenæ, arterieq; itextū-  
 tur ab extremis uenarū osculis prodeūtes, quæ ad  
 uterū ptinēt. Coeūtibus aut inter sese illis, ac quæ  
 ex eo coitu factæ sūt, rursum cōcurrētib<sup>9</sup>, ex ipsis  
 fieri cōtingit par illud uenarū et arteriarū utrūq;  
 quod in umbilicū inserit. At enī arteriæ quidē ueo-  
 sicā cōplexæ, ad arterias illas tendūt, quæ a ma-  
 gna per spinā porrecta, ac bipariūto scissa ad sibi  
 subiectū utraq; cr<sup>o</sup> mittūtur, sicut paulo atq; oste-  
 sum est. Venæ autē simul atq; ex umbilico se prō-  
 pferit coeūtes magnā perficiūt, quæ ad gibbū io-  
 cineris tēdit, haud proculea uena, quæ ad poro-  
 tas est. Hæc igit uena sine arteria ē: ac post illā to-  
 ta caua. Quicqd enī ei<sup>9</sup> uenæ gibbas iocineris pre-  
 ptat partes, quodq; indidē ad spinā pfertur, oē  
 id nullā habet adiūctā arteriā. Nec uero alia ul-  
 la ex ijs uenis, quæ p gibba iocineris expādūtur,  
 adiacētē arteriā, uadā est. sic nec quæ septo trans-  
 uerso intextæ sunt, quas a caua dū septū transis-  
 gūt, oriri ac ppagari dixim<sup>9</sup>. Iā uero ei<sup>9</sup> quæ tho-  
 racē alit uena, quā in simiis paulo supra cor ortū  
 habere ostēsuz est: hæc quoq; uidere licet, p spinā  
 sine arteria descēdere. Nihilō hac minus notabili  
 alia magnitudine, quā hūerariā diximus appelo-  
 lari, sine arteria est: unaq; oēs quotquot ab ea pro-  
 pagant rami, præterquā unicus tm̄, quē in eo no-



# DE DISSECT. ARTE. Fo. xx.

do, quo brachiū cū cubito coartat, ortū habere: et ad interiora pfundi<sup>9</sup> recedere, occultariq; memoratū est: quēadmodū etiā uena illa interior, quæ p axillā fert. Hæ siq; deæ duæ solæ p pfūdiora cubiti cū arteriis se porrigūt. aliæ porro uenæ, quæ p cubiti supficiē expādūtur, oēs arteriis carent. tres enī, aut quatuor ab ea, quæ p axillā iter hz, pducī ātea dixim<sup>9</sup>: aliāq; etiā nū his āpior, quæ ex ābab<sup>9</sup> cōflāt. Hæ inq; oēs in utraq; manuū uenæ arteriā copulatā nō habēt. Ad eūdē se hz modū uena ea, quæ circū brachiū os p auersaz ei<sup>9</sup> partē cōtorquet, subideq; ad cutē emergēs, circa extuberātē brachiū nodū, ad cubitū ptigit. Hæc etenim oīs q; ei<sup>9</sup> soboles sine arteriis excurrit: similr et e iugulariis quæ supficiē innatāt cū oibus indi dēenatis ramis. Iā quæcūq; collo intextæ sūt uenæ, usquedū ad scapulas extēdātur: tū quas cūo q; ubi de ipsarū disseccionib<sup>9</sup> sermo haberetur, dixim<sup>9</sup> ad uicina clauiculis loca spgi oīno tenues: hæ inq; oēs solutæ liberæ q; uagātur. Quī de multis, quæ p faciē, caputq; expādūtur, uenis, per pauca oīno arteriis adiacēt: sicut paulo ante diximus, cū de arteriis quæ et p tpa, et post aures subter cutē extāt, agerem<sup>9</sup>. Deniq; ut summatī dicam<sup>9</sup>, supficiarū oīb<sup>9</sup>, aut quæ p dorsū, latera, totū thoracē, inferiorēq; uētrē, sub sūma cute expādūtur, nulla iuenias subditā arteriā. Vtiq; earū etiā, quæ ex subchartilagio deorsū ferunt, quas



## GALENI LIB.

copulari, ac cōfluere cū uenis ex imis uētris ptib⁹  
 sur sū uer sus sese attollētib⁹, dictū est, nulla quæ  
 mō in supficie innatet, appositā hz arteriā: sicut  
 quæ alti⁹ cōditæ, p̄ internas musculorū rectorū par  
 tes porrigunt, illæ etenim habēt. Quæ autē, nec sup  
 ficiariæ oīno sunt, et ab ijs quæ p̄fundi⁹ abscondū  
 tur, ortū habēt: ad hūc cōstāt modū. Nā quæ ex  
 alto deorsus tēdūt, adiacentē natæ sunt arteriā.  
 Quæ ex imo subeūtes supne ueniētib⁹ uenis cōiū  
 gūtur, sine arterijs ad glādia quæ dā euadūt. Si o  
 milititer ex ijs, quæ p̄ sacrū os ad e⁹ loci musculos  
 spargūtur, unica cū arteria cōiūcta est: aliarū autē  
 nulla. Tū uero quas ad genitale ferri dicebam⁹,  
 in exteriorib⁹ musculis nascētes, ne illæ qdē cū ar  
 terijs copulātur. Haud aliter, quæ p̄ crura se ef  
 fundunt uenæ, subter tibiæ cutē. si qdē cū magna  
 uena paulo ante, quā ad poplitē ptingat, triparti  
 to illic scindat: quæ ex ea diuisiōe ad iteriora sub  
 it, una cū oībus, quos obiter emittit ramis, arte  
 riā adiūctā natā ē. quæ autē ad cutē recedūt, ea  
 rū ne una qdē adiacētē hz arteriā. Hæ igit sine ar  
 terijs sunt uenæ. Arteriæ autē sine uenis illæ sunt,  
 quæ in aīalibus etiā dū i utero agētib⁹, uesicā am  
 plexant: quas ab ūbilico ad arteriā spinæ apposi  
 tā p̄ferri dixim⁹, circa illas maxie ptes, ubi ea bis  
 partito scissa, ramos ad sibi subiectū utrūq; crus  
 traducit. Quā ea q; ppago, quæ in cōceptib⁹ cū a  
 magna arteria se prōpserit, in unā arteriosaz ino

# DE DISSECTARTE. Fo. xxi.

serit. Ea inq̃ nō substantia mō corporis, sed usu etiā, ac functione arteria est: & ipsa absque uena porrigit. Arteriæ porro sine uenis, nō tm̃ in cōce ptibus, uerū etiā in iā perfectis animantibus ui suntur. Primum magnæ illæ, quæ ex corde proo deūt: una quidē quæ ad quintā usque thoracis uer tebrā descendit: altera, quæ prima omniū ad iuo gulū effertur. post has, ea etiā, quā ad scapulā, & axillā sinistiorē tendere ostensum est. Harū enī unaquæq̃ aliquā diu sola citra uenæ copulā excurrit: et ea quidē, quæ ad quintā uertebrā deo scendit, usquedū a uer tebra subnixa fuerit, quæ aut ad iugulū tendit, donec ad locū puenerit ubi thym⁹ ē positus: quæ uero ad sinistiorē axillā, donec prope primā costā pcesserit. Iā arteria sio ne uena est, ex carotide propago una, quæ sola ad textū retis instar habēs ascēdit. Hāc enī uidere li cet, multū ab eo recedere foramēto, p quod extreo mā iugulariā ad cerebrū subire dictū est. Enīue ro ipsum q̃ reti si le textū sine uena est: tū quæ ino didē ulterius pcedūt, i ipso pgressu nullā habēt adiacētē uenā prius q̃ coire icipiāt: tū uero, quæ ad septū transuersuz ptinēt, earū nullā cū uena iungit, prius q̃ in extrema inciderit uenax, quas a caua nūerosiori sobole propagari ostēsuz prius est. Quēadmodū, nec primæ illæ ppagines, quæ ad iecur et uētrē, et lienē, et i testina mittunt. Nā ne illis qdē adiacet uena, prius q̃ incipiāt cōiūgi.

*End g. d. m. c. arteriarum*



GALINI LIBER  
GALENI DE NERVORVM  
dissectione, commentarium: Antonio Fortolo

Ioseriensi interprete.



Qvod nulla particularum animæ neque  
motum, quæ arbitrarium uocamus, neque  
sensum sine nervo obtineat: ac quod  
si incidat nervus, immobilis cõfestim  
insensibilis que reddat particulas: inter omnes constat  
medicos. Quod autem principium, origoque nervorum sit  
cerebrum, sicut et spinalis medulla, quodque nervi  
partim ex cerebro, alii ex spinali oriuntur medulla: id  
vero minime omnibus notum, exploratumque fuit. Certe  
verum quod in dissectionibus corporum apparet, ad hunc  
se habet modum. Ipsi quidem anteriores ventriculi, per  
cerebrum in priorem præcedentes partem, sensum leniterque  
in angustum coarctant, fere in speciem figuræ turbata:  
donec ad principium pertigerit nasi, mutuo situ  
adpositi, ac sese perpetuo contingentes, ut nihil inter  
ipsos sit medium, præter tenuem membranam, meningem  
Græci vocant. Horum quidem finium ad partem utramque,  
unum dextra, et alter sinistra, nervus est, crassitudinem  
notatu digna, et fere omnium nervorum aliorum molliissimum.  
ex ipso quodammodo prodiens cerebro, procurrens autem in oculos  
extra calviam, per foramen prorsus æque patens, ac  
latum quanta est nervi ipsius crassitudo. Positum autem est  
id foramen quod primum nasci incipit oculorum regio: ac  
tibi, si contemplantur fueris, nervi isti, seu quædam oculorum  
radices esse videbuntur. Dissolunt autem haud quædam  
in plures fibras, ceterorum omnium nervorum modo, quod in



# DE DISECT. NERVO. Fo. xxij

ea, a quib' suscipiunt instrumenta uarie dispgunt,  
 sz alio quodā mirabili plane mō, quē nec facile sit  
 explicare, nec si tibi explicuero, fortasse credas,  
 utiq; priusq; spectaculo interfueris. uterq; enī in se  
 bi aduersū oculū, intro subiēs ī latū sese explicat:  
 ipsūq; q̄ in oculo inest uitreū hūorē, ī orbē sphaera  
 mō ambit: nihil q̄cōp detrimēti cōtrahēs, quo min⁹  
 naturā, substātiāq; cerebri inibi retineat. Sed ī so  
 lis hisce nervis, anteq̄ in oculos inserant, sensibilis  
 q̄dā meat⁹ inest: unde ipsos nōnulli anatomici, po  
 ros. i. meatus appellat: alij opticos nervos. i. uisui  
 admīstros uocat, noīe a functiōe, quā ipsi obeūt,  
 factō. Ac primā q̄dē hāc cōiugationē neruorū, q̄ a  
 cerebro oriant nūerāt, quā aliarū oīm est mollissi  
 ma. Altera post hāc est cōiugatio, ī musculōs q̄ ocu  
 los movēt distributa, durior mltō ea, quā mō mēo  
 raurim⁹. Hāc ex calua foras emergit, haud alr, at  
 q̄ illa, tenuissimo dirēpta osse. Cui dū p caluā pro  
 cedit, nō ēt cū primū nascit, adiacet tertia neruorū  
 cōiugatio. uocat aut ipsos molleis: mltiq; circa pri  
 mā statī radicē appēt, si mō diligētī aim aduertis.  
 nā negligētī intueti, un⁹ oēs esse uideant. Mollio  
 res q̄dē certe isti sūt, tū scdā, de qua mō agebam⁹:  
 tū uero ep⁹, quā mox seq̄tur, quarta cōiugatiōis,  
 aliarūq; deiceps cōiugationū neruis. si q̄dē tales, eo  
 magis uidēt, qd' cū plures nūero sint, capillorūq;  
 mō prætēues, ita pibus inter se spatij adiacēt, ut  
 citra cōpssū, cōnexūq; cōmittāt. Paulo ijs durior  
 neruorū ex cerebro prodeūtiū quarta cōiugatio cū

## GALENI LIB.

tertia miscet: ac preptat, primū qdē crassā mēbra  
 nā cerebri custodē: deīde ipsū etiā capiti obductū  
 os: tū rursus ad palatū retrocedit. At enī tertia cō  
 iugatio, sicut ex frequētib⁹ pris radicib⁹ uidet cō  
 stare, ita ēt uarie scīdit ac definit. Neq; enī refert,  
 utrū solui a seipsis inuicē dicas prædictā neruorū  
 frequētiā: an totū discīdi, ptibus in diuersa tēdētī  
 bus, ita siue dicat aliq; ipsos a seipsis nervos discer  
 ni, ac separi: siue a tota cōgerie, quālibet oriri ptē:  
 nihil intererit. Primū igit unaquāq; ipsoꝝ ps ad  
 īferiorē capitis ptē recedit: id qd anatomicos latuit.  
 Cōe aut est calua foramētū per qd hēc deorsum  
 fert, et arteriā carotidis reliquū ad cerebrū subit:  
 utriq; aut una est. Id enī si qm nō adderet, subin  
 telligere attē semp opz: præserti eos q semel mō au  
 disse, nullū neq; a cerebro, neq; a spīali medulla  
 neruū esse nō cōiugatū: s; semp alterū ad dextrā,  
 ad sinistrā alteꝝ, eadē prorsus utriq; magnitudi  
 ne sitū obtiere. Quo itaq; mō nerui isti, p collū, ac  
 thoracē ad loca præcordiū subdita ferātur: quāq;  
 ipsoꝝ sit distributio, pcedēte oꝝ one ostēdm⁹. Nūc  
 aut ad reliq; cōiugatiōis tertiæ ptes referamus cō  
 mētationē. Ea e calua emergēs, attigit qdē scd⁹ az:  
 catēꝝ haud quāq; eodē mō cū ea pmiscet, quo aliā  
 quādā pmiscēt: sed sicuti iā dixi, uarie scīditur.  
 Stati itaq; ps eius qua maxilla iūgit, affi aures erū  
 pit: quā quēadmodū cū neruis, a quīta cōiugatiōe  
 ueniētib⁹ coeat, nō ita multo post, audies. hēc igit  
 parua quādā ipsi⁹ ps est. Qd aut tanq; trūcus est



# DE DISSECT. NERVO. Fo. xxiiij.

oim indidē prodeūtiū particlax, quæ & ipsæ ras  
 mox, ac palmitū uicē, rōnēq; subeūt, biptito scin  
 dit primū: deīde mēbrū utrūq; in multas rursum  
 ptes. Et alterū qdē, tū in tēporū musclos dispēsāt,  
 tū eos quos molitores appellāt, tū uero ī eos quoq;  
 q̄ ex supiore mādibula ortū hñt. Quī ad gingiuas  
 ēt, & dētes, & cutē, quæ faciei prætēdit, ex hisce  
 neruis aliq̄ pueniūt. Alterū uero ī radices dētiū, q̄  
 ī inferiore ipacti sunt mādibula, diuidit, ad eūdē  
 oīno modū, quo pri<sup>9</sup> illud mēbrū in supiores: ac p  
 inde ad gīgiuas labraq; inferiora ppagies mittit,  
 ut illud ad supiora: plurīa aut ipsi<sup>9</sup> ps ad liguæ tu  
 nicā ptinet. Ac nōnulli cōiugatōez hāc neruorū,  
 gustatoriā uocāt: qm̄ mīsterio ipsorū sensus gustā  
 di obeat. Ad hūc igit̄ modū se hz tertie neruox cō  
 iugatōis distributio. Diātū porro & de quarta ē,  
 quā recte Marīn<sup>9</sup> aīaduertit, abs tertia recedētē,  
 ad palatū puenire: de qua & ipsa, in dissectionū li  
 bris ptrauim<sup>9</sup>. Est aut̄ & alia neruorū cōiuga  
 tio, quā Marīn<sup>9</sup> quītā noīat. Quāq; nō ea qdē ex  
 una adeo radice pdit: sz uicini inter sese nerui ipsi  
 sunt, cū alter tñ ex altera radice oriāt. Et hic qdē  
 quē auditoriū appellāt, ī priore magis pte, ad au  
 diū meatus emergēs, una cū dura mēbrana, quæ  
 indidē, unde neru<sup>9</sup> ipse exorīt: cū qua ī latitudinē  
 sese effundēs meatui leniter obducit. Alter uero ex  
 pte auersa, ī alterū qd̄dā ossis (qd̄ lithoides Græ  
 ci ab insigni duritie uocāt) excidēs foramē, cācū  
 appellatū: id enī antiqiores anatomici nomē indide



# GALENI LIB.

rūt, cū utiq; pforare nō potuissēt exa & eū anfra  
&ū, p quē neru⁹ post aures foras erūpit. Coit autē  
mox neruus hic, cū eo, quē cū de cōiugatiōe tertia  
agerem⁹ foras p dire, qua maxilla iūgit, oñsuz est:  
haud illo qdē ad hūc pueniēte, sz opiēte poti⁹, dū  
hic ad septigat. Ex ā bob⁹ aut ipfis cōmixt⁹ ps plu  
ria, uel ut uer⁹ dicā, totū fere in latū musculū sci  
di: q cuti subiect⁹, buccā (Υαβου Graci uocāt)  
fine maxilla mouet, quē nos pmi obſeruauim⁹ unū  
manifesto atq; eū utriq; existētē. Meminisse enī te  
opz, ut semp subaudias p m copulā, etiā si iter loq  
quēdū, aliqñ omittat. ad hūc igit modū quita dis  
tribuit cōiugatio. Age em̄, qñ ita placet Marino,  
unicā esse fingam⁹, et si duplicē liqdo esse cōstet.  
Sexta aut neruox ex cerebro nascētū cōiugatio,  
foramie usa ē, qd a suturæ Λ Graci elemētī speciē  
præferētis, extremitatē inferiōrē interpatet. Prici  
pia aut statī e cerebro pdeūtū triū neruox obtiet:  
quæ ubi e calua emerſerit, mltifariā cū inter se cō  
miscēt, tū et cū adiacētib⁹ alijs, de qb⁹ mox dicet.  
Supeſt septia neruox cerebri cōiugatio, cui⁹ pars  
optia i liguæ musclos dispēſat. Exigua uero quæ  
piā particla, ad musclos puenit, cōes chartilagis,  
quæ i gutture clypei imaginē præfert: et iſeriox la  
tex ep⁹ quæ a figura Λ liæ Græcæ labdoides appel  
lat: ac i alios quosdā nō ſep. Cōmiscēt aut ut dictū  
est, iter sese nerui ad iſeriora capitis tēdētes, tū is  
q abs tertia cōiugatiōe, tū is q a duobus nouissime  
mēoratis oriū. Ac ſane neruox, q a ſpiali medulla

# DE DISSECT. NERVO. Fo. xxiii.

nascūt priā, scđ aq̃ cōiugatio, sēp societate inīt  
cū hisce nervis. Et tibi qđ p sepe uidebit, qđ de al  
tero traūcit in alter, ceu uiculū aliqđ dūtaxat esse  
ā bob' cōe. Id uero inter i nervox alter auget, qua  
si ad ip̃s accedēs, seseq̃ cū illo cōmiscēs: alterū, ut  
pote abs quo secesserit, exiliorē facit. Quā res ma  
gnā hisce cognoscēdis neruū, caliginē offudit oib'  
anatomicis, ut iter seip̃i diuersa, ac pugnātia pde  
rēt pluriaq̃ ip̃ox i uno q̃ ignorātia extaret. Quos  
dā enī nūq̃ nō mō i oib' aiantib', s; ne i solis qđ  
fimijs ferri, quasi nūq̃ alr se hēat, scripsērt. Nō  
nullos uero nō i solis tm̃ fimijs, s; i oib' etiā aial'i  
bus, quox sex esse gñā i disseccionū libris retulim'  
ad eūdē sēp cōstare modū. Hoc aut̃ pr̃sus ip̃i igno  
rauerūt quō p̃prijs gutturis musclis nerui e sexta  
cōiugatiōe distribuāt, tenui utriq̃ prodeūtes, ut  
sex nūero oēs sint. Cognouerūt aut̃ qđā duos tm̃ ex  
iis: alijs ne hos qđē. Enī uero muscli gutturis illi,  
quos cū alijs qbusdā ptib' cōes hz, nō sēp a sexta  
nervos accipiūt: sicut nec q̃os illd' gutturis, qđ tū  
a figura Δ labdoides: tū a spē v v o e i d e s uocant:  
cū osse pectoris cōnectūt. De q̃b' exatē ac cumlate  
i disseccionū libris p̃traat: ubi ēt de trib' agīt ner  
uis, quo utiq̃ illi mō dispēsēt: quos p̃ foramē ad  
extremā λαβδ o e i d u futurā interpatēs prodire  
diātū ē. Quāq̃ utriq̃ oēs p̃pe unū esse arbitrāt,  
q̃ carotidib' adhæret arterijs: q̃ si laq̃o itercipiat,  
mutū aial reddit: ab his igit, gutturis muscli p̃pa  
gines accipiūt. Aliox porro duox, alter ad utrosq̃



# GALENI LIB.

faucium musculos, linguaque radicem pertingit: alter ad  
 scapulae musculum, et ad eum qui laevus est, aliosque quos  
 dā ex loci musculos. Qui et ipsos latuerunt eorum ner-  
 uorum, qui carotidibus adiacent, per pagines non paucas:  
 quas ipsi per collum, thoracemque delati edunt, prius quam in  
 uentris os incidat, quo optima pars eorum nervorum se inse-  
 rit, et spargit. Enimvero mirum illud est, quod in praecor-  
 dia quasdam ex ipsis particulas distribui tradunt,  
 cum de hac coniugatione nihil ne minimum quidem, praecor-  
 dia accipiant. quod autem de medio thorace retror-  
 sum aliqua ueniant particula ab his nervis ad quosdam  
 gutturis musculos, non etiam dicunt. nec uero quam uis  
 isti nervi habeant. Atque, si laesi fuerint, causa sunt ut  
 obmutescat animans, ac magna nervorum arteriarum adia-  
 centium coniugatio, quam istorum partes sint, si offendant,  
 uocem eripiedi uim obtinet. Varia autem ultra praecor-  
 dia nervorum istorum est distributio: nam et a spinali mes-  
 dulla, quae circa eam est parte, quosdam sumunt ramus-  
 los, eosque ad posita inibi uisces, a dispergunt, cumque his  
 miscent, quos autem a coniugatione tertia per collum, tho-  
 racemque deferri diximus. Atque hos rursus ipsos nero-  
 uos, qui propter costarum radices deorsum porriguntur,  
 a sexta coniugatione esse propagatos prodiderunt omnes.  
 Multiplex porro ex horum permixto est cum nervis  
 intercostalibus, alijs qui fere omnibus, qui per lumbos, gra-  
 ciliores extendunt: denique cum reliqua eorum parte, qui ad os  
 uentriculi pertinet. Varia etiam digestio nervorum est per  
 extimam peritonaei regionem: quam minime propositum est  
 accuratissime in praesentia persequi.

FINIS.





